


「痛いときにしが、歯医者に行かない」と、 歯はどうなるの？

多久市口腔ケアプロジェクトより



74歳
女性

家族構成：高齢者夫婦2人暮らし
移動手段：自分で運転できる

年齢	71歳			72歳			73歳			74歳															
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
治療	虫歯	虫歯1本			虫歯1本			虫歯1本			虫歯2本			虫歯1本			虫歯2本								
	拔牙	↓ 拔牙			割れて1本拔牙			治療中断			治療中断			割れて2本拔牙											
義歯治療																									
定期管理	← 歯周病や義歯の定期的な管理は無し →																								




< 経過 >



- ①虫歯で歯が痛かったため通院し治療。
- ↓
- ②痛みが和らいだため、歯周病の定期管理や義歯の作製をせずに治療を中断。
- ↓
- ③残された歯では噛み合わせが上手くいかず、噛む力によって歯が割れてしまった。

■割れた歯のイメージ



歯の破損を予防するためには、特定の歯に強い力が加わらないように、正しく噛めることが大切です。噛み合わせの確認やお手入れにより歯周病を定期的に管理したり、義歯を使用したりしましょう。

また、虫歯がひどくなり歯の根を治療すると、歯が割れやすくなります。定期健診で早めに虫歯を見つけて、適切な治療を受けましょう。